

## **Cesta do Asie bez očkování může být riziko. Vakcína IXIARO® proti japonské encefalitidě je dostupná v ČR.**

**V posledních letech se zvyšuje počet infekcí nebezpečného viru japonské encefalitidy v turisticky populárních destinacích jižní a jihovýchodní Asie. Nejvíc náchylná na smrtelný průběh infekce je dětská populace do 15 let věku, navíc každé páté dítě po prodělané nemoci zůstává trvale postižené.**

Japonská encefalitida je neuroinfekce, jejímž původcem je virus stejného rodu, jako jsou například viry středoevropské klíšťové encefalitidy nebo viry žluté zimnice. Přenáší jej komáři rodu *Culex*, kteří primárně sají krev na zdrojích infekce, což jsou prasata a vodní ptáci. Právě na venkově a mimo velká města, kde pobývá většina vietnamských cestovatelů navštěvujících své rodinné příslušníky, je hrozba nákazy japonskou encefalitidou největší. Nemoc může začít horečkami a prudkými bolestmi hlavy.

### **Japonská encefalitida je hlavním problémem veřejného zdravotnictví v Asii**

Výskyt japonské encefalitidy je rizikový v 24 zemích v Asii a západním Pacifiku, včetně mnoha oblíbených turistických destinací. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje na 68.000 případů ročně, což je o jednu třetinu vyšší, než se původně předpokládalo. Národní očkovací programy proti japonské encefalitidě v některých rizikových zemích úspěšně snižují výskyt onemocnění, ale nesnižují riziko pro onemocnění cestujících. V roce 2012, deset zemí (např. Indie, Nepál, Srí Lanka, Thajsko, Japonsko a Vietnam) z 24 zemí s rizikem přenosu viru japonské encefalitidy zahrnuly očkování proti japonské encefalitidě jako součást národního očkovacího programu.

### **IXIARO je jediná registrovaná vakcína v Česku, již pro děti od 2 měsíců věku**

Až v 50 procentech případů dojde k rozvoji deliria, křečí, někdy i těžkých duševních poruch. Onemocnění často končí smrtí. Riziko nákazy se zvyšuje při pobytu delším než 30 dnů, při pobytu ve volné přírodě nebo na venkově a při pobytu v době, kdy dochází k přemnožení komárů. Význam může mít i u krátkodobých cestovatelů při plánovaném pobytu mimo města.

### **Jediná registrovaná vakcína proti japonské encefalitidě v České republice je IXIARO®.**

V Evropské unii je registrovaná od roku 2009, Evropská komise schválila i podání dětem již od dvou měsíců věku. Vakcína je dobře snášená. Očkování by mělo být zahájeno asi pět týdnů před cestou, aby bylo možné dokončit imunizaci včas. Základní vakcinační cyklus se skládá ze dvou dávek podaných v odstupu 28 dní. Dětem od tří let, mládeži a dospělým je určena dávka 0,5 ml. Dětem ve věku od dvou měsíců do tří let se dávkuje poloviční množství. Očkování provádí na žádost praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, očkovací centra a centra cestovní medicíny. Informujte se u svého lékaře.

*PEČLIVĚ PROČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI. Výdej vakcíny je vázán na lékařský předpis. Vakcína je určena k injekčnímu podání a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vakcinační akce schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR.*